

GALERÍA

Fotográfica

Sarna Costrosa


Cynthia Melgarejo¹, Lucie Puell², Martín Salomón², César Ramos²

Agente: *Sarcoptes scabiei* variedad *hominis*

Descripción: Se caracteriza por la presencia de placas descamativo-costrosas y nódulos eritematosos, asociados a prurito leve. Compromete cuero cabelludo, cara, palmas, plantas y uñas. La infestación del ácaro es masiva, encontrándose en diferentes estadios de su ciclo evolutivo y en gran cantidad.

Reportada en pacientes portadores de alguna inmunodeficiencia, enfermedades difusas del tejido conectivo, tratamientos inmunosupresores, neoplasias linfoproliferativas, enfermedades neurológicas crónicas, infección por VIH y HTLV-1.

CASO 1. Paciente varón 60 años, con antecedente de diabetes y psoriasis. Con TE: 2sem placas hiperqueratósicas, costrosas.



¹ Médico Residente 4° año Servicio Dermatología HNCH

² Médico asistente Servicio Dermatología HNCH
Correo electrónico: pattygueres@yahoo.es

CASO 2. Paciente mujer 36 años, acude con TE:: 2 meses, placas hiperqueratósicas, costrosas en planta de pies y descamación de manos. Sarna costrosa asociada a HTLV-1 .



CASO 4. Paciente mujer 11 años, natural de Amazonas que acude con TE: 1 año. (HTLV-1 negativo) Sarna costrosa asociada a Linfoma Hodgkin.

